

УДК 598.2

*Закирова Г.Ф.*  
*магистрант 2 года обучения*  
*Башкирский государственный педагогический университет*  
*Г.Уфа, Российская Федерация*

**ЭКОЛОГИЯ ПТИЦ СЕМЕЙСТВА *PASSERIDAE* В  
КАРАИДЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

Аннотация: Полное знание о птицах как о самостоятельной единице в эколого-биологическом пространстве, возможно только при изучении всей совокупности природных и иных условий, в которых они обитают.

Ключевые слова: воробей, самец, самка, биология

**Zakirova G.F.**  
**Master's Degree student**  
**Bashkir State Pedagogical University named after M.Akmulla**  
**Ufa, Russian Federation**

**ECOLOGY OF BIRDS OF THE PASSERIDAE FAMILY IN  
KARAIDEL DISTRICT OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN**

The summary: Full knowledge of birds as an independent device in the ecological and biological space is possible only by studying all the sets of natural and natural conditions in which they live.

Key words: sparrow, male, female, biology

Домовый воробей (*Passer domesticus*). Птица небольших размеров, телосложение компактное, округлой формы. Самец имеет коричневый с

черными отметинами верх, голову с серой «шапочкой» (или коричневой, если речь идет об итальянском воробье) и серо-белый низ, с чёрными горлом и грудью. Самку можно отличить по однородному буро-сероватому оперению.

Распространение: Оседлый и кочующий вид, который имеет 12 подвидов, распространенных на всех континентах, кроме севера Арктики и Антарктики. В Европе обитает везде, и лишь на севере Скандинавии локально. В Италии гнездование происходит только вдоль северной границы, всего насчитывается 10-50 тысяч пар. Также можно встретить гибриды домового воробья с итальянским воробьём, ареалом обитания которого является остальная часть полуострова.

Среда обитания: Птица предпочитает культурные ландшафты, среди которых сельские территории, мелкие и крупные населённые пункты, она редко улетает дальше, чем на два километра от жилья человека. Иногда гнездится в районах скал и лесистой местности.

Биология: Ее гнезда можно заметить в углублениях скал, каменистых склонов, по береговым откосам, в столбах, дуплах, среди спутанных ветвей, в основании гнёзд цапель и дневных хищников. Домовый воробей относится к колониальному виду, который часто объединяется с полевыми воробьями и обыкновенными скворцами. Ежегодно с апреля происходит от 2 до 4 кладок яиц по 5 яиц, насиживание осуществляется совместно самкой и самцом в течение 10-14 дней. Вылет птенцов обычно происходит на 10-19-е сутки. Птица может питаться любым кормом и редко улетает в поисках пищи из населенных пунктов. В конце лета большие массы птиц, в особенности, молодняка можно встретить на полях, куда они прилетают для пропитания. Птица отличается быстрым и прямолинейным полетом с частыми взмахами. Песенный репертуар состоит из слабо музыкальных пискков и чирикания.(Захаров, 1998).

Полевой воробей (*Passer montanus*). Для птицы характерен изящный вид мелких размеров, компактное телосложение слегка округлой формы. Голова – каштанового цвета, на белых «щеках» отличительные черные пятна. Верх тела буроватого цвета с тёмными отметинами, грудь и бока – бежевого оттенка. Половой диморфизм отсутствует.

Распространение: Оседлый, перелётный и кочующий вид, известно 10 подвидов в Евразии. Со временем был завезён в Северную Америку, в Австралию, Индонезию, на Филиппины и т.д. В Европе ареал обитания не располагается севернее 60° с. ш. В период осени и зимы происходит откачка северных популяций на южные территории, горных – в нижние районы. В Италии обычно гнездится популяция в количестве от 500 до 1000 тысяч пар, находящихся ниже 1000 метров над у. м. Обычен на пролёте и зимовке.

Среда обитания: Птица предпочитает перелески, светлые леса, луга, антропогенные ландшафты. Ее можно встретить в сельской местности, на приусадебных участках, на окраинах городов.

Биология: Гнездование осуществляется в дуплах деревьев. Птица колониальная, поэтому может легко объединяться с другими видами. Ежегодно с апреля 2-3 раза в год откладывает 2-7 яиц, которые пара насиживает совместно 11-14 дней. Вылет молодняка происходит на 15-20-й день после вылупления. По отношению к человеку проявляет большую осторожность по сравнению с другими представителями рода. Любит образовывать стаи, особенно зимой, может вместе с другими воробьиными перемещаться в поисках удобных ночевок и участков, богатых кормами. Характерен легкий, слегка волнообразный полет, с быстрыми, неглубокими взмахами крыльев. Издаёт чирикающие, звонкие, металлические и носовые звуки. Пищей служат, в основном, растения и их семена, в гнездовой период в корм идут членистоногие и их личинки.

Список использованных источников:

1. Захаров, В.Д. Биоразнообразие населения птиц наземных местообитаний Южного Урала [Текст]/В.Д. Захаров/– Миасс: ИГЗ УрО РАН, 1998. – 158 с
2. Ильичев, В.Д. Экология и управление поведением птиц [Текст]/В.Д. Ильичев/– М: Знание, 1984. – 64 с

©Г.Ф.Закирова, 2018